

gente rural

Boletín informativo sobre el Medio Rural de ADER LA PALMA

CULTIVO



	ACELGA	AJO	ALBAHACA	ALCACHOFA	APIO	ARVEJAS	BERENJENAS	BRÓCOLI
FAMILIAS	Chenopodiáceas	Liliáceas	Labiadas	Compuestas	Umbelíferas	Leguminosas	Salanáceas	Crucíferas
CICLO	Anual	Anual	Anual	Perenne	Anual	Anual	Anual	Anual
ÉPOCA DE SIEMBRA								
. DIRECTA	-	Nov - Dic	Todo el año	Hijos / Octubre	-	Oct. - Nov.	-	-
. SEMILLERO	Julio - Agosto	-	40 días apróx.	Sept. - Oct.	Agosto - Septiembre	-	Febrero - Marzo	Agosto - Septiembre
. TRASPLANTE	Ag. - Sept. - Oct.	-	-	Enero	Nov. - Dic.	-	Abril - Mayo	Noviembre
DISTANCIA ENTRE SURCOS	60 cm	20 cm	50 cm	100 cm	60 cm	80 cm	60 cm	60 cm
DISTANCIA ENTRE PLANTAS	40 cm	12 cm	25 cm	80 cm	40 cm	15 cm	50 cm	50 cm
PROFUNDIDAD DE SIEMBRA	3 cm	2 cm	0,5 cm	2 cm	0,5 cm	3 cm	0,5 cm	0,5 cm
TIEMPO MEDIO PARA COSECHAR	3 meses	6 meses	3 meses	6 meses	5 meses	3 meses	4 meses	3 - 4 meses
RENDIMIENTO POR m² (kg/m²)	2,1	0,4	1,44	1	0,36	1	0,21	0,28

CULTIVO



	CALABAZA	CEBOLLA	COL (REPOLLO)	COL (LOMBARDA)	COLIFLOR	ESCAROLA	ESPARRAGO	ESPINACA
FAMILIAS	Solonáceas	Liliáceas	Crucíferas	Crucíferas	Crucíferas	Compuestas	Liliáceas	Chenopodiáceas
CICLO	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Perenne	Anual
ÉPOCA DE SIEMBRA								
. DIRECTA	Marzo	-	-	-	-	-	Garras/todo el año	-
. SEMILLERO	-	Nov. - Dic.	Agosto - Octubre	Agosto - Septiembre	Agosto - Septiembre	Enero - Febrero	-	Oct. - Nov.
. TRASPLANTE	-	Febrero - Marzo	45 días aprox.	45 días aprox.	45 días aprox.	30 días aprox.	-	30 días aprox.
DISTANCIA ENTRE SURCOS	60 cm	20 cm	60 cm	60 cm	60 cm	50 cm	120 cm	50 cm
DISTANCIA ENTRE PLANTAS	60 cm	15 cm	50 cm	50 cm	50 cm	40 cm	50 cm	30 cm
PROFUNDIDAD DE SIEMBRA	1 cm	0,5 cm	0,5 cm	0,5 cm	0,5 cm	0,5 cm	garras a 30 cm	1 cm
TIEMPO MEDIO PARA COSECHAR	4 meses	3 - 4 meses	3 meses	3 meses	3 meses	3 - 4 meses	24 - 36 meses	1,5 - 3 meses
RENDIMIENTO POR m² (kg/m²)	0,73	1,81	1,15	-	0,7	2,1	0,46	2,2

CULTIVO



	HABAS	LECHUGAS	MAIZ DULCE	MELÓN	NABO BLANCO	PEPINO	PIMIENTO	PUERRO
FAMILIAS	Leguminosas	Compuestas	Poaceas	Cucurbitáceas	Crucíferas	Cucurbitáceas	Solanáceas	Liliáceas
CICLO	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual
ÉPOCA DE SIEMBRA								
. DIRECTA	Oct. - Nov.	-	Mar.-Abr.- May.-Jun.	-	Sept. - Oct.	-	-	-
. SEMILLERO	-	Todo año. Según variedad	-	Marzo	-	Marzo	Marzo - Junio	Mayo - Junio
. TRASPLANTE	-	30 días aprox.	-	Abril - Mayo	-	Abril - Mayo	45 días aprox.	45 días aprox.
DISTANCIA ENTRE SURCOS	50 cm	40 cm	60 cm	100 cm	40 cm	90 cm	60 cm	40 cm
DISTANCIA ENTRE PLANTAS	15 cm	30 cm	15 - 20 cm	80 cm	25 cm	40 cm	40 cm	20 cm
PROFUNDIDAD DE SIEMBRA	4 cm	0,5 cm	2 - 5 cm	2 - 3 cm	1 cm	2 cm	1 cm	1 cm
TIEMPO MEDIO PARA COSECHAR	4 meses	3 meses	3 meses	3 meses	3 meses	2 - 3 meses	3 - 4 meses	4 meses
RENDIMIENTO POR m² (kg/m²)	0,74	1	1,5	2,49	1,13	1,86	0,4	-

CULTIVO



	RABANITO	REMOLACHA	SANDÍA	TOMATE	ZANAHORIA
FAMILIA	Crucíferas	Chenopodiáceas	Cucurbitáceas	Solanáceas	Umbelíferas
CICLO	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual
ÉPOCA DE SIEMBRA					
. DIRECTA	Todo el año	Todo el año	-	-	Todo el año
. SEMILLERO	-	-	Marzo	Mar-Abr-May	-
. TRASPLANTE	-	-	Abril - Mayo	8 cm. altura	-
DISTANCIA ENTRE SURCOS	25 cm	40 cm	100 cm	60 cm	25 cm
DISTANCIA ENTRE PLANTAS	8 - 10 cm	15 - 20 cm	40 - 60 cm	30 cm	8 cm
PROFUNDIDAD DE SIEMBRA	1 cm	1 cm	2 cm	0,5 cm	Escasa
TIEMPO MEDIO PARA COSECHAR	30 días	3 meses en adelante	3 meses en adelante	3 meses en adelante	3 meses en adelante
RENDIMIENTO POR m² (kg/m²)	-	0,86	2,46	1,08	2,8

CARTILLA DEL HORTICULTOR

Estos contenidos han sido redactados con la colaboración del proyecto PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL: POR UN MEDIO RURAL ACTIVO, con la financiación de:

